

Merhode Détaillée
par M. Thomas.

Ne seroit il pas utile,
aux jeunes Eleves, qu'on les mit
apportée, de voir les idées, qui ont
donné occasion à la production, de
telle et telle chose et de les
instruire,
des differens moyens, qui ont servi
à la perfectionner ?

MARS
1753.



ARC 874°58

1

2

Des Expériences, faites Sur divers cadavres,
Pour s'assurer des Propriétés du Lithotome
Couvert.

Premier Essai.

Des Premières Reflexions au Sujet de L'operation de La
taille a la methode de M^r. Foubert, et des premières Idées qui
ont donné occasion a La Construction du Lithotome Couvert.

J'avois Entendu faire L'Eloge de la methode de M^r. f. a
M^r. Fournier, lors que la Description qu'en a fait le veri-
tablement Grand maître, dans Le 1.^{er} vol. des mem^{rs}. de L'ac.
de Chirurgie, me tomba dans les mains. je remarquay
Qu'outre La Simplicité de Cette Operation, on la feroit
Lateralement au Corps de La Vessie; Et Qu'on ne touchoit
point du tout a La Verge, ni y aux parties Essentielles qui
La composent; Et Qu'au Lieu de Sonde Crenellée Pour
Conduire L'instrument dans La Vessie, Comme on le fait
a toutes les methodes Unites, il ne falloit que laisser
remplir Cette même Vessie D'urine, pour pouvoir y
Introduire Le Lithotome. Voilà donc trois Objets qui
fixerent mon attention. Le 1.^{er} est de faire L'operation
dans Le Corps même de La vessie. Le 2.^o objet est de faire
Cette Operation, Sans toucher a L'uretre, a L'orifice de La
Vessie, aux conduits Excretoirs de La Semence &c. Le 3.^o est de



pouvois Executer cette Operation sans le secours de la Sonde.
Voilà Déjà trois Circonstances, qui me convinrent tout-à-fait
En faveur de cette merveilleuse Decouverte.

Il y a Environ quatre ans que M.^r foubert vint à Bicêtre
pour y voir des fistules à l'anus sur les Quelles il fit Den
Experiences; nous le priâmes de vouloir bien nous faire l'opérân
de la taille a sa methode, le Qu'il fit avec Bonte et avec
tout le Succès possible. Le même auteur me fit même
présenter de tous les Instruments propres a ce Sujet, dont il
venoit de se servir.

Quelque Jours après je pris le trois-Quart de M.^r foubert, et
je l'introduisis dans la Vessie d'un Cadavre préparé ~
Comme on le Divise, mais au dessous et près du Cubit En
a Côté du raphe: après avoir tiré le troiscart d'urine ~
Sortis en tout de suite je portay le lithotome de M.^r foubert
de long de la Canelure du troiscart, et fis l'operation De
haut En Bas, qui est le Contraire de M.^r foubert. a
l'ouverture du Sujet, je trouvoy l'incision de la Vessie
petite mais placée a Côté de son Orifice: je voulus,
dans D'autres tems la faire au même Endroit et avec
les mêmes Instruments, je tombay sur l'orifice de la
Vessie; une autre fois du Côté opposé, mais le plus souvent
dans l'Endroit où M.^r foubert faisoit son Operation.

Le Scalpel trompeur Des anciens, Le Bistoury herniaire,
Composé d'une Sonde Courbe dans la Quelle est Enfermée
une Lame; Le Bistoury herniaire de M.^r Le Drane, Le
lithotome Caché, me vinrent tous dans l'idée. je fis Dans
l'instant Executer, par un serrurier de Bicêtre, l'idée que
j'avois Concüe de faire un Instrument assez long pour parvenir

x arsenal de chirurgie de Sauter. /

jusques dans la venue, mais qui renfermât une lame propre à faire les Divisions, et des faire aussi grandes, mais pas plus grandes qu'on se Desiroit. je réunis par la machine que l'on voit à la pièce postérieure de la Lame, au moyen de laquelle, on peut éloigner la Lame du Corps de l'instrument où elle en est enfermée, de ligne en ligne, depuis une jusqu'à vingt.

Avec le 1.^{er} Model de cet Instrument, tout Defectueux qu'il étoit, je fis l'opération de la taille il y a Environ trois ans, sur deux Cadavres de M.^r Andouiller, qui venoit faire des Experiences à notre Amphiteatre, et de M.^r Gervon; Je réunis à merveille et ces deux Messieurs m'encouragerent à poursuivre.

Quelques jours après il me vint un ancien Bon ouvrier en Serrurie, ex qui me fit un Model sur le prem.^{er} Instrum.^{ent} mais bien mieux proportionné et mieux fait. je le portai à M.^r Foubert et lui dit tout ce que j'avois Conçu au Sujet de la methode: il eut la bonté, à mes prieres, de venir à notre hospital, En voir l'Effet; il me fit plusieurs Objections et me dit que l'on pouvoit Operer à la methode avec cet Instrument.

J'allay ensuite Communiquer mes Idées et demandes d'avis à tous les Operateurs de la taille, de Paris. tous eurent la Bonté de m'écouter à perfectionner le projet et le Communiquer à l'Académie.

Enfin rendu plus certain de l'utilité de cette Decouverte, et faisant plus sûrement cette Operation, J'allay aussi Interrompre les momens de Monneur Le premier Chirurgien du Roy, qui eut la Complaissance de m'écouter et de me promettre qu'il se Donnoit la peine de venir à Notre



Hopital pour y voir des Exercices, En que je n'avois qu'à conti-
nuer et menager des Cadavres, vers des jours, où le Roy devoit
venir à choisir.

Monsieur De La Martiniere vint Effectivement, En je
fis L'operation en la presence sur trois Sujets: il parut En
Etre Contenu, et me dia D'observer. Si on pouvoit rencon-
trer toutes sortes de vessie avec le Lithotome, si des grosses
pierres sortoient facilement, par des sections qui En
resultoient; Quelles parties Etoient Interposées dans La
Section &c. En D'Ecrire toutes mes Observations et de Les
Luy porter a un autre Voyage, a choisir.

Second Essay.

De L'Estat où doit Etre la vessie pour pouvoir
operer.

Si L'on veut Operer avec ^{un} succès, toutes sortes de
Vessies, il faut qu'elles soient pleines simplement, sans Etre
aucunement distendues; je dis que toutes Les vessies doivent
Etre pleines, afin de presenter devant le pubis, une surface
Et une resistance necessaire a la facile Introduction du
Lithotome; sans Quoy il arriveroit que par le Deffaut
de plénitude, les même Vessies Estant flaquies, non seule-
ment L'instrument n'Entreroit pas dans la Vessie où
on le Desiroit, mais Encore qu'il auroit de la peine
a y Entrer; parce que le fluide ne remplissant pas la
Cavité où il est retenu, n'opose point de resistance, et qu'il
peut Etre repoussé dans le reste de la Cavité par la pointe
même du lithotome, qui pourroit D'ailleurs en Entrant ~

Dans cet organe, aller percer ses parois posterieures, ou glisser ~
dessus, dessous, ou a Cote', si ils ne sont pas Eloignes des uns des
autres, par le fluide qui y est renfermé.

Les moyens des plus propres pour remplir la vessie, sont
de faire retenir l'urine au malade, jusqu'a ce que la
vessie soit pleine: Cela se fait plus ou moins promptement
selon que l'urine se filtre plus ou moins vite, et selon que
le malade a bu peu ou beaucoup. Car raporte aux
Cadavres, on Injecte de l'Eau dans la vessie avec pour
la remplir, et on l'empêche de sortir avec le Bandage
a Cremailler.

Troisieme Essay.

Si il est possible D'Entrer facilement dans toutes
sortes de venies, avec le Lithotome Couvert.

Il est certain qu'on peut entrer facilement dans les
petites venies, qui sont des especes qui peuvent apporter
quelques Difficultés a l'introduction du Lithotome
Couvert, et qui obligent d'être plus attentif dans la
maniere de luy faire faire le premier pas dans cet
Organe. J'ay fait cette Operation avec tout le Succès
Bonible, sur des venies qui a peine contenoient un poicon
D'urine. plus des venies seront grandes plus Elles
présenteront de Surface, plus aussi il sera facile
D'operer survenant. il est par consequent Impossible
de manquer cette Operation, En prenant des precau
tions necessaires.



Quatrieme Essay.

Des parties Interrenées dans une Division de 20. L.
de 13. Lignes et de 10. Lignes du dedans au dehors.

Pour faire l'operation de la taille avec le Lithotome
Couvert, on Commence les Divisions a Quelques Lignes du
Bubis, et on les termine dans une Section où l'instrument
est borné a 20. Lignes, au plus bas fond de la vessie, a
Coté de la vericule seminale gauche, et jusqu'au muscle
transverse dans les Grandz Sujets; la Division qui en resulte
est de 13. 16. 17 Lignes; Et si l'instrument est fixé a 13 Lignes
la Section de la vessie en a Environ 12. Selon le tissu plus
ou moins lâche de la vessie: Et ainsi a proportion ~~de~~
~~la~~ ~~tissu~~ ~~plus~~ ~~ou~~ ~~moins~~ ~~lâche~~ par rapport aux autres degres
où on fixera l'instrument.

Dans l'Espace d'une de ces Sections la plus Grande,
il se rencontre souvent deux petits rameaux de la honteuse
Commune anterieure, dont l'un va se Distribuer au
Bulbe de l'uretre, et l'autre vient former l'hémorrhoidale
Externe, quoique ~~elle~~ ~~soit~~ ~~la~~ ~~même~~ Celle cy soit souvent
formée par la honteuse Commune postérieure, au quel
Cas il n'y a que la ramification qui va au Bulbe
qui est Comprise dans la Section.

Dans une Section où l'instrument seroit fixé a
13. Lignes, cette Dernière arteriale seroit aussi divisée;
mais dans une Section de 10. Lignes fort souvent Elle est
Epargnée, et dans celles qui seroient au dessous, il ne s'y

trouverois point d'arterioles propres à donner du sang. il y a la petite arteriole qui vient former la honteuse Externe qui passe Immédiatement sous la Symphise du pubis, qui peut être aussi Divisée, si on Commenceoit la Division Immédiatement sous le pubis mais à la Quelle on ne touche pas, parce qu'il faut toujours s'Eloigner du pubis de quelques lignes.

Toutes les Divisions Commencées au même point, & l'union et Entre les muscles Erecteurs et accélérateurs, Elles Divisent le tissu Cellulaire de la vessie et celui qui sépare les muscles. La plus grande de ces Divisions, va jusqu'aux petites fibres charnues qui forment le muscle transverse qui se trouve souvent coupé totalement. Les vessie, donc, son tissu Cellulaire, Quelques fibres du releveur de l'anus, le tissu Cellulaire des muscles bulbo et ischio-caverneux, le muscle transverse, les arterioles qui s'en viennent de nommer, la Graine de la peau, qui est toujours elle-même Divisée par la façon de terminer la Section, sont les parties qui sont comprises dans l'Etendue de l'opération.

Cinquieme Essay.

Le Cinquieme Essay a eu pour objet de savoir Quel Degré de force on donneroit au Lithotome Couvert, ~ relativement à celles qui opéroient sur les parties qu'on divise.

Pour cela on a fait attention, à son Effet sur des Différentes vessies, et on a remarqué que le Corps de l'instrument ployoit sur des vessies racornies et dures, n'étant



Gros dans son milieu que Comme une plume Ordinaire a
Ecrire, Et que la lame proportionnée a le Corps avoit l'arré
Sur les mêmes venies; de sorte qu'on a Augmenté son Volume
Au point ou il En, Qui a resisté Sur toutes sortes de Sujets.

Sixieme Essay.

Dans le Sixieme Essay on a pris l'Etendue des Different
Bassin dans les divers Sujets, pour fixer celle qu'on devoit
Donner a cet Instrument.

1.^o Les Squeletes adultes nous ont appris, que l'Espace qu'il y
a du pubis a l'os Sacrum, dans une ligne droite, Etoit
de 4. a 5. pouces.

2.^o Cet Espace dans les Enfants de 3. ans, Est deux pouces ou
deux pouces et Demi.

3.^o Dans les Grands Sujets maigres, de la peau du periné
a la venie, il y a Environ deux pouces d'Epaisseur.

4.^o Dans les Grands Sujets les plus Gras, l'Espace de la peau
a la venie, est de trois et trois pouces et Demi ou Environ.

Il Resulte de ces Differentes Observations, 1.^o Que ces
Instruments Etant long de quatre pouces, pouvoient avoir
avec de longueur, pour pouvoit parvenir dans les venies des
Sujets les plus replets, et où les parties seroient dans un
Etat naturel: mais Comme les parties pouvoient Etre
Gonflées par quelque maladie, Elles pouvoient aussi avoir
un Espace du periné a la venie, plus Grand que de trois
pouces et Demi, C'est le qui a fait, qu'on a fixé l'Etendue
du Lithotome a quatre et Demi. 2.^o Qu'il Est Impossible,

Dans une vessie d'une certaine grandeur, d'aller touches des parois postérieures et encore moins les parties qui sont Derrière.

Septieme Essay.

On a Examine' quel Degré D'Extension, peuvent avoir les Differentes vessies, en voulant forcer un fluide a y entrer?

Les vessies des Cadavres, qui ont le moins souffert de maladies, ont le plus resisté a L'Effort du fluide dont on a voulu les remplir avec Excès. Celles au contraire des hommes maigres et des Enfants ^{qui ont souffert} ont moins resisté: mais il a fallu des Efforts Considerables pour les Diviser dans des uns et des autres Cas.

Le But de ces Experiences étoit de voir jusqu'à quel Point D'Extension les Differentes vessies pourroient prêter, afin que par des Efforts mal Entendus (ce que l'on ne demande nullement pour L'operation de la taille) les mêmes vessies étant trop distendues ne viennent a former des accidens plus facheux que la maladie dont il est en Question et de L'Eviter.

On a encore remarqué que les vessies les plus racornies, ont prêté, jusqu'à un certain point, sans Effort.

Huitieme Essay.

Cet Essay a eu pour objet de sçavoir, Quel Degré de tendue on pouvoit donner aux Incisions, afin de permettre aux diverses pierres de sortir, sans produire de Contusion.

Dans une division de cinq lignes, une Bierre de 7 Li. de Diamètre sort facilement.



Une Division de Dix Lignes, laisse aisement Sortir une pierre de 13. Lignes de Diametre: par conséquent une Incision de 13. ou 20. Lignes, laisse passer une Bierre de 18. Lignes et de Deux ~ poices de Diametre, sans Effort et sans aucun D'accident.

Neuvieme Essai.

On Examina dans cette Experience si on pouvoit facilement Comprimer le tronc de la honteur Commune Anterieure.

Les Connoissances anatomiques nous apprennent bien Qu'il estoit possible D'arreter le Sang des arteries, ~ que fournis la Branche de la honteur Commune Anterieure, qui vont se Distribuer a la verge et au fondement, En faisant une legere compression sur le tronc même de cet artere qui rampent Interieurement le long de la branche de d'os ischium. mais pour être plus certain de le faire on a procede ainsi.

Après avoir fait l'operation de la taille, on a Ouvert le ventre; on a mis dans le tronc de la honteur un peu au dessus de la Division En Illiaque, un Gros tuyeau a Injection; par le moyen du Quel on a fait pousser de l'Eau avec force qui a bien-tôt fait apparcevoir une petite arterie, dont qu'on ne faisoit qu'une petite Division, qui laissoit Sortir un jet fin, mais qu'on ~ Empechoit de Darder, si-tôt qu'on appuyoit le Doigt vers l'ischium. Dans les Grandes Divisions il s'ay trouvoit deux de ces petits rameaux, qui s'arretoient

auray bien En faisant une legere Compression a la Branche de ces Os, Et qui Dardoient de nouveau sitôt qu'on Envois de Comprimer.

Il y a des Sujets où la honteuse est bien Interieurement sur cette Branche de l'ischium, Et pour pouvoir la Comprimer il faut un peu recourber le Doigt.

Cette Compression en a peu pres aussy facile dans les Grands et petits Sujets.

Dixieme Essai.

On a En icy pour objet de voir, si dans toutes les Divisions Les Corps Etrangers qui se trouvent dans la vessie, peuvent Etre Entraînés par les Urines ou par les Injections.

Lors qu'on fait une grande ouverture a la vessie, parce que la grosseur de la Pierre l'exige, cette ouverture se termine au plus bas fond de la vessie et a plus d'un Pouce de l'orifice, sur le Côté, et Côté de la venticule seminale. Il est bien certain que le pus, les Graviers les Sables se Sortiront facilement par la seule pente qui a Les Determine.

Dans les plus petites Divisions, l'angle Inferieur de la Section, est toujours plus Bas que l'orifice de la vessie; Et Quand il seroit au niveau de cet Orifice, ces même matieres Etrangères, peuvent fort bien avoir une issue libre par la playe, puisqu'elles Sortent naturellement par l'urètre.



Onzième Essai.

On Examinera dans Cette Experience le changement de Situation de la venue dans Les diverses positions du Sujet.

On a remarqué Que le point Extérieur où on commence L'operation, En bien Eloigné du point Interieur où on veut parvenir. Dans la venue, Lors que la Situation du Sujet Est Differente de Celle qui Est donnée. En Effet, Lors Qu'un Malade est Couché Obliquement Les Cuisses peu flechies, Le Bassin Est porté en dehors: parconsequent En faisant suivre la même Direction a votre Instrument Le point où Cet Instrument arrivera dans la venue, Sera ailleurs Qu'a celui où il doit être dans la Situation donnée, et la Section Sera plus ou moins au dessous de L'orifice.

Si au contraire Le Sujet est Couché Orizontalement Et que les Cuisses soient tout-à-fait ployées sur le ventre, Le Bassin est porté en dedans, Le point où L'instrument Entre dans la venue, En bien Eloigné de celui où on souhaite Qu'il perce dans ~~une~~^{la} Situation donnée, Et le Commencement de la Section se trouvera sur la venue, Bien Au dessus de L'orifice.

Si Dans une Situation Orizontale, Le Sujet porte le bassin ou a droite ou a gauche, Et Qu'il n'observe pas D'être Dans une ligne directe au Corps, on trouvera Encore Bien de la Difference, de L'Endroit où on parviendra dans la venue, de celui où on souhaite la rencontrer, en Gardant toujours dans Ces Situations du même point extérieurement.

en conduisant son Lithotome dans la même direction, Que Lorsque la Situation En. donnée; il ira ou trop a droite ou trop a gauche et divisera la vessie ailleurs que dans l'endroit où on le Desire.

Cette Situation donnée est d'orientale, L'os Sacrum Bien appuyé sur la table, Les Cuisses fléchies il est vrai, mais de manière qu'elles observent une ligne perpendiculaire et que tous le Corps soit placé, si droit, qu'une ligne puisse le partager également en deux. C'est par le moyen de cette Situation, bien Entendue, qu'on parvient toujours a faire la Division dans le Corps de la vessie Latéralement, Eloignée de l'orifice de cet Organe de 3. ou 4. lignes et en conduisant son Instrument, de façon, qu'il observe une ligne droite et parallèle a Celle qui partage le Corps, du pubis au vertex.

Dans des autres essais, on s'en attache a reconnoître, avec la Sonde, des pierres dans la vessie. Pour cela on ouvroit le ventre et la vessie, En on y Introduiroit, tantôt une pierre Dure, tantôt une Motte, ou Grosse ou petite et on la cherchoit avec la Sonde, après avoir bien Couvé et la vessie Et les tegumens Du Ventre.

Après avoir fait l'operation on s'exerceoit a rencontrer les Différents Calculs, avec des tenettes, a des Bien chargés et des tivers. /



[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

~~11/11/11~~

Mr. Lewis